



患者名【 】様 パス名 : 突発性難聴

		入院日( / )			/ ~ / / ~ /			/ ~ /			退院日( / )	
食事	特に制限はありませんが、高血圧や糖尿病の方は治療食となります。 また、血糖を測られる方は病院食以外食べないようにしてください。										* 御退院おめでとうございます。*	
注射	点滴は1週間の予定です。 ステロイドの点滴が 始まります。 4mgから開始となります。		ステロイド (4mg)	ステロイド (2mg)	 ※)ステロイドの影響で不眠・便秘・胃の痛みや 不快感など、副作用が出ることがあります。 その際は看護師へお知らせください。							
検査	医師の指示により血糖値を測る場合があります。  朝食前(7:30)・昼食前(11:30)・夕食前(17:30)・就寝前(21:30) * 血糖測定の間は多少前後することがあります。  入院中、2回聴力の検査があります。(入院後約1週間後と退院前)											
治療	入院日より高気圧酸素治療が開始となります。専門の技師が説明します。 高気圧酸素の時間は前日に看護師がお知らせに参ります。 ※)高気圧酸素の際耳抜きができず、耳が痛くなることがありますが、我慢せず言ってください。										退院日まで高気圧酸素治療があります。 高気圧酸素治療終了後退院の準備を お済ませ下さい。	
安静	制限はありません。外出・外泊を希望される方は医師の許可のもと外出・外泊届けが必要になります。											
清潔	入浴できます。 高気圧酸素療法後、2~3時間は治療の効果がなくなってしまうので、それ以外の時間をお願いします。 入浴されない方は身体拭きのタオルをお持ちします。										お支払いが終わりましたら 再来カードをお渡しします。	
説明	医師から治療についての説明があります。 入院診療計画書にサイン後提出して下さい。 入院生活については看護師より説明します。										退院後の生活について説明します。	
ご意見 ご要望	何かご不明な点があれば看護師へ尋ねられてください。										計画説明日	
											年 月 日	
											同意書ご署名	
											計画説明者	
										本人以外の場合は、患者様との関係		