

# 悪性リンパ腫レジメン

## CHASE療法（シクロfosファミド+シタラビン+デキサメタゾン+エトポシド）

### ◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

| 薬の名前                 | 基本量 (mg/m <sup>2</sup> ) | 作用      | 時間  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----------------------|--------------------------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| パロノセトロンバッグ           | 0.75mg                   | 吐き気止めです | 30分 | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |
| シクロfosファミド注<br>生理食塩液 | 1200mg/m <sup>2</sup>    | 抗がん剤です  | 2時間 | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |
| シタラビン注<br>生理食塩液      | 2000mg/m <sup>2</sup>    | 抗がん剤です  | 3時間 |   | ↓ | ↓ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ↓  | ↓  |    |    |    |    |
| デキサメタゾン注<br>生理食塩液    | 40mg/body                | 抗がん剤です  | 30分 | ↓ | ↓ | ↓ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |
| エトポシド注<br>生理食塩液      | 100mg/m <sup>2</sup>     | 抗がん剤です  | 2時間 | ↓ | ↓ | ↓ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部