

悪性リンパ腫レジメン

DeVIC療法（デキサメタゾン＋エトポシド＋イホスファミド＋カルボプラチン）

◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m ²)	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
パロノセトロンバッグ	0.75mg	吐き気止めです	30分	↓																					↓							
デキサメタゾン注 生理食塩液	40mg/body	抗がん剤です	30分	↓	↓	↓																			↓	↓	↓					
エトポシド注 生理食塩液	100mg/m ²	抗がん剤です	2時間	↓	↓	↓																			↓	↓	↓					
イホスファミド注 生理食塩液	1500mg/m ²	抗がん剤です	2時間	↓	↓	↓																			↓	↓	↓					
カルボプラチン注 生理食塩液	300mg/m ²	抗がん剤です	2時間	↓																					↓							
メスナ注	300mg/m ²	出血性膀胱炎 予防です	30分	↓	↓	↓																			↓	↓	↓					

*メスナは、イホスファミド投与時、4時間後、8時間後に3回投与

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部