

悪性リンパ腫レジメン

R-THP-COP療法（リツキシマブ＋シクロfosファミド＋テラルビシン＋ビンクリスチン＋プレドニゾン）

◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m ²)	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
パロノセトロンハブグ	0.75mg	吐き気止めです	30分	↓																					↓							
シクロfosファミド注 生理食塩液	750mg/m ²	抗がん剤です	2時間	↓																					↓							
テラルビシン注 生理食塩液	50mg/m ²	抗がん剤です	約5分	↓																					↓							
ビンクリスチン注 生理食塩液	1.4mg/m ² (Max:2mg)	抗がん剤です	約5分	↓																					↓							
プレドニゾン錠	100mg/body	抗がん剤です	内服	←—————→																					←—————→							
ヒドロコルチゾン注 生理食塩液	100mg/body	アレルギー予防です	静注	↓																					↓							
ボラミン注 生理食塩液	5mg/body	アレルギー予防です	30分	↓																					↓							
リツキシマブ注 生理食塩液	375mg/m ²	抗がん剤です	7時間	↓																					↓							

- *シクロfosファミドは、年齢、PS、Alb値により投与量が変わることがあります
- *テラルビシンは、年齢、PS、Alb値により投与量が変わることがあります
- *ビンクリスチンは、年齢、PS、Alb値により投与量が変わることがあります
- *プレドニゾンは、年齢、PS、Alb値により投与量が変わることがあります
- *リツキシマブは、投与時間、日時が変わることがあります

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。