

悪性リンパ腫レジメン

THP-COP療法（シクロfosファミド+テラルビシン+ビンクリスチン+プレドニゾン）

◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m ²)	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パロセトロンバッグ	0.75mg	吐き気止めです	30分	↓																					↓						
シクロfosファミド注 生理食塩液	750mg/m ²	抗がん剤です	2時間	↓																					↓						
テラルビシン注 生理食塩液	50mg/m ²	抗がん剤です	約5分	↓																					↓						
ビンクリスチン注 生理食塩液	1.4mg/m ² (Max:2mg)	抗がん剤です	約5分	↓																					↓						
プレドニゾン錠	100mg/body	抗がん剤です	内服	←————→																		←————→									

* シクロfosファミドは、年齢、PS、Alb値により投与量変更になることがあります

* テラルビシンは、年齢、PS、Alb値により投与量変更になることがあります

* ビンクリスチンは、年齢、PS、Alb値により投与量変更になることがあります

* プレドニゾンは、年齢、PS、Alb値により投与量変更になることがあります

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部