

悪性リンパ腫レジメン

mLSG15療法 (VCAP+AMP+VECP)

◆治療スケジュール(1コース:28日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m ²)	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
グラニセロンバッグ	3mg	吐き気止めです	30分	↓							↓							↓	↓	↓												
ピンクリスチン注 生理食塩液	1.0mg/m ² (Max:2mg)	抗がん剤です	約5分	↓																												
シクロフォスファミド注 生理食塩液	350mg/m ²	抗がん剤です	2時間	↓																												
ドキソルビシン注 生理食塩液	40mg/m ²	抗がん剤です	約5分	↓																												
ドキソルビシン注 生理食塩液	30mg/m ²	抗がん剤です	約5分								↓																					
ラニムスチン注 生理食塩液	60mg/m ²	抗がん剤です	1時間								↓																					
ビンデシン注 生理食塩液	2.4mg/m ² (Max:3mg)	抗がん剤です	約5分															↓														
エトポシド注 生理食塩液	100mg/m ²	抗がん剤です	2時間															↓	↓	↓												
カルボプラチン注 生理食塩液	250mg/m ²	抗がん剤です	1時間															↓														
プレドニゾン錠	40mg/m ²	抗がん剤です	内服	↓							↓							↓	↓	↓												

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部