

大腸癌レジメン

Bev+mFOLFOX6療法（ベバシズマブ＋フルオロウラシル＋レボホリナート＋オキサリプラチン）

◆治療スケジュール(1コース:14日間)◆

| 薬の名前 | 基本量 (mg/m ²) | 作用 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| アバスチン注 生食 | 5mg/kg | 抗がん剤です | 30～90分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | |
| パロノセトロンバッグ デキサート注 | 0.75mg 6.6mg | 吐き気止めです | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液 | 85mg/m ² | 抗がん剤です | 2時間 | ↓ | 同時投与 | | | | | | | | | | | | | ↓ | 同時投与 | | | | | | | | | | | | | |
| レボホリナート注 5%ブドウ糖液 | 200mg/m ² | フルオロウラシルの 効果を高める薬です | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液 | 400mg/m ² | 抗がん剤です | 約5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液 | 2400mg/m ² | 抗がん剤です | 46時間 | ←→ | | | | | | | | | | | | | | ←→ | | | | | | | | | | | | | | |

☆アバスチンは初回90分かけて投与する。特に問題なければ、2回目は60分、3回目以降は30分での投与も可能。

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部