

# 大腸癌レジメン

## Bev+Cape療法（ベバシズマブ+カペシタビン）

### ◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m <sup>2</sup> )	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アバステチン注 生食	7.5mg/kg	抗がん剤です	30~90分	↓																				
カペシタビン錠	2000mg/m <sup>2</sup>	抗がん剤です	朝夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	← 休薬 →						

☆アバステチンは初回90分かけて投与する。特に問題なければ、2回目は60分、3回目以降は30分での投与も可能。

☆カペシタビンは2000mg/m<sup>2</sup>を2分割投与する。

体表面積	1回用量
1.36m <sup>2</sup> 未満	1,200mg
1.36以上1.66m <sup>2</sup> 未満	1,500mg
1.66以上1.96m <sup>2</sup> 未満	1,800mg
1.96m <sup>2</sup> 以上	2,100mg

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部