

大腸癌レジメン

CAPIRI±Bev療法（カペシタビン+イリノテカン±ベバシズマブ）

◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m ²)	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
カペシタビン錠	2000mg/m ²	抗がん剤です	朝夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	←							
アパステン注 生食	7.5mg/kg	抗がん剤です	30~90分	↓																休薬					
グラニセトロンバッグ デキサート注	3mg 6.6mg	吐き気止めです	30分	↓																					
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150mg/m ²	抗がん剤です	1時間	↓																					

☆アパステンは初回90分かけて投与する。特に問題なければ、2回目は60分、3回目以降は30分での投与も可能。

☆カペシタビンは2000mg/m²を2分割投与する。

体表面積	1回用量
1.36m ² 未満	1,200mg
1.36以上1.66m ² 未満	1,500mg
1.66以上1.96m ² 未満	1,800mg
1.96m ² 以上	2,100mg

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部