

大腸癌レジメン

C-mab+mFOLFIRI療法（セツキシマブ+フルオロウラシル+レボホリナート+イリノテカン）【隔週】

◆治療スケジュール(1コース:14日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m ²)	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パロノセトロンバッグ デキサート注	0.75mg 6.6mg	吐き気止めです	30分	↓														↓													
アービタックス注 生食	500mg/m ²	抗がん剤です	2時間	↓														↓													
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150mg/m ²	抗がん剤です	2時間	↓	同時投与													↓	同時投与												
レボホリナート注 5%ブドウ糖液	200mg/m ²	フルオロウラシルの 効果を高める薬です		↓															↓												
フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	400mg/m ²	抗がん剤です	約5分	↓														↓													
フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	2400mg/m ²	抗がん剤です	46時間	←→														←→													

☆セツキシマブ注は生食500mLを使用する。

☆セツキシマブ注: infusion reaction 予防として、前処置: デキサート注6.6mg+ボラミン注5mg(または内服薬: レスタミン錠50mg)をセツキシマブ投与15~30分前に投与する

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部