

大腸癌レジメン

P-mab+CapeOX療法（パニツムマブ+カペシタビン+オキサリプラチン）

◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m ²)	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カペシタビン錠	2000mg/m ²	抗がん剤です	朝夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	←—————→						
パロノセトロンハッグ デキサート注	0.75mg 6.6mg	吐き気止めです	30分	↓																休薬				
ペクティビックス注 生食	6mg/kg	抗がん剤です	60分	↓																				
オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	130mg/m ²	抗がん剤です	2時間	↓																				

☆ペクティビックス注は生理食塩液で希釈し、60分以上かけて点滴静注すること。

ただし、1回投与量として1,000mgを超える場合は生理食塩液で希釈して約150mLとし、90分以上かけて点滴静注する。

☆ペクティビックス注: インラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を用いて投与すること。

☆カペシタビンは2000mg/m²を2分割投与する。

体表面積	1回用量
1.36m ² 未満	1,200mg
1.36以上1.66m ² 未満	1,500mg
1.66以上1.96m ² 未満	1,800mg
1.96m ² 以上	2,100mg

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部