

大腸癌レジメン

RAM+FOLFIRI療法（ラムシルマブ＋フルオロウラシル＋レボホリナート＋イリノテカン）

◆治療スケジュール(1コース:14日間)◆

| 薬の名前 | 基本量 (mg/m ²) | 作用 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----------------------|--------------------------|------------------------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| サイラムザ注 生食 | 8mg/kg | 抗がん剤です | 60分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| パロセトロンバッグ デキサート注 | 0.75mg 6.6mg | 吐き気止めです | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| イリノテカン注 5%ブドウ糖液 | 150mg/m ² | 抗がん剤です | 90分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| レボホリナート注 5%ブドウ糖液 | 200mg/m ² | フルオロウラシルの 効果を高める薬です | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液 | 400mg/m ² | 抗がん剤です | 約5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液 | 2400mg/m ² | 抗がん剤です | 46時間 | ←→ | | | | | | | | | | | | | | ←→ | | | | | | | | | | | | | |

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部