

大腸癌レジメン

S-1+IRI±Bev療法(エスワン+イリノテカン±ベバシズマブ)

◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m ²)	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
S-1(エスワン)	80mg/m ²	抗がん剤です	朝夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	←							
アバステン注 生食	7.5mg/kg	抗がん剤です	30~90分	↓																休業					
グラニセトロンバッグ デキサート注	3mg 6.6mg	吐き気止めです	30分	↓																					
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150mg/m ²	抗がん剤です	90分	↓																					

☆アバステンは初回90分かけて投与する。特に問題なければ、2回目は60分、3回目以降は30分で投与も可能。

☆S-1は80mg/m²を2分割投与する。
 体表面積 1回用量
 1.25m²未満 40mg
 1.25以上1.5m²未満 50mg
 1.5以上 60mg

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部