

# 胚細胞腫瘍レジメン

## VIP療法（イフォスファミド＋エトポシド＋シスプラチン）

### ◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m <sup>2</sup> )	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デキサメタゾン注 グラニセトロンバッグ	9.9mg/body	吐き気止めです	30分	↓	↓	↓	↓	↓																	↓	↓	↓	↓	↓		
イフォスファミド注 生理食塩液	1200mg/m <sup>2</sup>	抗がん剤です	2時間	↓	↓	↓	↓	↓																	↓	↓	↓	↓	↓		
エトポシド注 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup>	抗がん剤です	2時間	↓	↓	↓	↓	↓																	↓	↓	↓	↓	↓		
シスプラチン注 生理食塩液	20mg/m <sup>2</sup>	抗がん剤です	2時間	↓	↓	↓	↓	↓																	↓	↓	↓	↓	↓		

メスナにて出血性膀胱炎を予防する

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部