

胃癌レジメン

Nivo＋FOLFOX療法（ニボルマブ＋フルオロウラシル＋レボホリナート＋オキサリプラチン）

◆治療スケジュール(1コース:14日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m ²)	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
オプジーボ注 生食	360mg	がん免疫療法剤です	30分	↓														↓														
パロノセトロン/バググ デキサート注	0.75mg 6.6mg	吐き気止めです	30分																													
オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	85mg/m ²	抗がん剤です	2時間	↓	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}
レボホリナート注 5%ブドウ糖液	200mg/m ²	フルオロウラシルの 効果を高める薬です		↓																												
フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	400mg/m ²	抗がん剤です	約5分	↓														↓														
フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	2400mg/m ²	抗がん剤です	46時間	←→							←→																					

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部