













乳癌レジメン

EC療法（エピルビシン+エンドキサン）

◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

| 薬の名前 | 基本量 (mg/m ²) | 作用 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|----------------------|--------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|--|--|
| アプレピタント | 1日目:125mg 2,3日目:80mg | 吐き気止めです | 1日1回 |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | |
| パロノセトロンパップ デキサート注 | 0.75mg 6.6mg | 吐き気止めです | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | |
| デカドロン錠 | 4~8mg | 吐き気止めです | 1日1(2)回 | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |
| エピルビシン注 | 90mg/m ² | 抗がん剤です | 約10分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | |
| エンドキサン注 | 600mg/m ² | 抗がん剤です | 1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | |

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部