

乳癌レジメン

HP+DTX療法（ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル）

◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m ²)	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グラニセロンバッグ デキサート注	3mg 6.6mg	吐き気止めです	30分	↓																					↓						
デカドロン錠	2~4mg	吐き気止めです	1日1(2)回		◻	◻	◻																			◻	◻	◻			
トラスツズマブ注 初回 生食	8mg/kg	抗がん剤です	90分	↓																											
トラスツズマブ注 2回目 以降 生食	6mg/kg	抗がん剤です	30分																						↓						
パージェタ注 初回 生食	840mg	抗がん剤です	60分	↓																											
パージェタ注 2回目以 降 生食	420mg	抗がん剤です	30分																						↓						
ドセタキセル注 生食	75mg/m ²	抗がん剤です	1時間	↓																					↓						

※注射用水で溶解後、生理食塩液で希釈
 ※トラスツズマブは初回90分、忍容性に問題がなければ2回目以降30分での投与が可能

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあげることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部