




卵巣癌レジメン

ベバシズマブ併用GEM+CBDCA療法(ゲムシタビン+カルボプラチン+ベバシズマブ)

◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

薬の名前	基本量	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アプレピタントカプセル	1日目:125mg 2,3日目:80mg	吐き気止めです	1日1回																					
デキサート注 ファモチジン注 パロノセトロンバッグ	6.6mg 20mg 0.75mg	吐き気止めです	30分	↓																				
ゲムシタビン注	1000mg/m ²	抗がん剤です	30分	↓																				
カルボプラチン注	AUC=4	抗がん剤です	1時間	↓																				
アバステン注	15mg/kg	抗がん剤です	30分~90分	↓																				
デキサート注	6.6mg	抗がん剤です	30分								↓													
ゲムシタビン注	1000mg/m ²	抗がん剤です	30分								↓													

☆アバステンは初回90分かけて投与する。特に問題なければ、2回目は60分、3回目以降は30分での投与も可能。

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部