

# 膵臓癌レジメン

## mFOLFIRINOX6療法（フルオロウラシル＋レボホリナート＋イリノテカン＋オキサリプラチン）

### ◆治療スケジュール(1コース:14日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m <sup>2</sup> )	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
パロセトロンバッグ デキサート注	0.75mg 6.6mg	吐き気止めです	30分	↓														↓														
オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	85mg/m <sup>2</sup>	抗がん剤です	2時間	↓														↓														
レボホリナート注 5%ブドウ糖液	200mg/m <sup>2</sup>	フルオロウラシルの 効果を高める薬です	2時間	↓	30分後より													↓	30分後より													
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150mg/m <sup>2</sup>	抗がん剤です	90分	↓	30分後より													↓	30分後より													
フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	2400mg/m <sup>2</sup>	抗がん剤です	46時間	←→														←→														

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部